

**Тестовые задания**  
**для прохождения аттестационного тестирования специалистами**  
**с высшим медицинским образованием,**  
**претендующими на присвоение квалификационной категории**  
**по специальности «Дерматовенерология»**

**II уровень сложности**  
**(ПЕРВАЯ квалификационная категория)**

РЕДАКЦИЯ 2019

***Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ***

При аллергических контактных дерматитах целесообразно проводить провокационные аллергические пробы

- а Ингаляционные
- б Интраназальные
- в Аппликационные
- г Внутрикожные

Какое заболевание относится к глубоким стрептококковым поражениям кожи?

- а Стрептококковое импетиго
- б Стрептококковая заеда
- в Околоногтевая фликтена
- г Вульгарное импетиго
- д Эктима

Первичный элемент при крапивнице

- а Пятно
- б Пузырь
- в Бугорок
- г Волдырь
- д Гнойничок

Какой из симптомов не характерен для микроспории волосистой части головы?

- а Зеленое свечение волос при осмотре под лампой Вуда
- б Обламывание волос на уровне окружающей здоровой кожи
- в Наличие муфты вокруг обломанного волоса
- г Асбестовидное шелушение

Для какого заболевания характерным признаком является сетка Уикхема:

- а Красная волчанка

- б Центробежная эритема Биетта
- в Псориаз
- г Красный плоский лишай
- д Болезнь Девержи

При выявлении аневризмы восходящей дуги аорты у пациента всегда следует исключить:

- а Ревматоидные заболевания
- б Специфические поражения при туберкулезе
- в Системные коллагенозы
- г Поздние формы сифилиса

Для стрептококкового импетиго характерно все перечисленное, кроме:

- а Появления на коже фликтен
- б Корок желто-зеленого цвета;
- в Быстрого распространения
- г Конглобатных элементов

Как препарат первой линии для лечения герпетического дерматита Дюринга применяют:

- а Витамины
- б Ретиноиды
- в Антибиотики
- г Препараты сульфонового ряда

Для стационарной стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме:

- а Элементы полностью покрыты серебристо-белыми чешуйками
- б Прекращения появления новых высыпаний
- в Отсутствия периферического роста элементов
- г Вокруг элементов - ободок Пильнова

При каком заболевании пузыри не окружены зоной гиперемии:

- а Пемфигоиде Левера
- б Буллёзной форме герпетического дерматоза Дюринга
- в Буллёзной форме рожистого воспаления кожи
- г Многоформной экссудативной эритеме
- д Токсидермии

Укажите патогистологический признак, характерный для крапивницы:

- а Паракератоз
- б Гиперкератоз

- в Гранулёз
- г Акантолиз
- д Отёк сосочкового слоя дермы

Для сальных желез характерно все, кроме:

- а Являются альвеолярными
- б Являются трубчатыми
- в Отсутствуют на ладонях
- г Отсутствуют на подошвах
- д Связаны с волосяными фолликулами

Симптом Арди-Горчакова встречается при:

- а Акантолитической пузырьчатке
- б Чесотке
- в Парапсориазе
- г Туберкулёзной волчанке
- д Опоясывающем лишае

Какое заболевание относится к поверхностным стафилококковым поражениям кожи?

- а Остиофолликулит
- б Фурункул
- в Гидраденит
- г Импетиго вульгарное
- д Эктима

Все перечисленные проявления относятся к осложнениям твердого шанкра, кроме:

- а Баланит
- б Баланопостит
- в Гангренизация
- г Фагеденизм
- д Уретрит

Первичный период сифилиса начинается с:

- а Внедрения бледной трепонемы в организм
- б Позитивации серореакций
- в Регионарного лимфаденита
- г Появления твердого шанкра
- д Появления фебрильной реакции

Клинические проявления, наиболее характерные для периода третичного сифилиса включают:

- а Папулы ладоней и подошв
- б Розеолезная сыпь на туловище
- в Сгруппированные бугорки

- г Широкие кондиломы
- д Гнезная алопеция мелкоочаговая

Для стафилодермий характерны все признаки, кроме:

- а Распространения вглубь
- б Поражения придатков кожи
- в Фолликулярных пустул
- г Поражения кожных складок
- д Воспалительных узлов

Наиболее частое осложнение чесотки:

- а Сепсис
- б Вторичная пиодермия
- в Рубцовая атрофия кожи
- г Флегмоны
- д Все вышеперечисленное

Ребенок, получивший лечение по поводу микроспории волосистой части головы, может посещать детский коллектив после:

- а Окончания лечения
- б Одного отрицательного анализа на грибы
- в Второго отрицательного анализа на грибы
- г Третьего отрицательного анализа на грибы
- д Шестого отрицательного анализа на грибы

Для стационарной стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме:

- а Изоморфной реакции (феномен Кёбнера)
- б Серебристо-белых чешушек на высыпаниях
- в Наличия псевдоатрофического ободка Воронова
- г Прекращения появления новых высыпаний
- д Отсутствия периферического роста элементов

Клиника псориаза у детей характеризуется:

- а Полигональными зудящими папулами
- б Серопапулами
- в Сосудистыми пятнами
- г Лихеноидными фолликулярными папулами
- д Ярко-красными папулами с шелушением и многослойными белыми чешуйками

Для дискоидной красной волчанки характерны все симптомы, кроме:

- а Эритемы
- б Крупнопластинчатого шелушения
- в Фолликулярного гиперкератоза

- г Рубцовой атрофии
- д Телеангиэктазий

При переходе кожной формы эритематоза в системную красную волчанку в крови могут наблюдаться все перечисленные изменения, кроме:

- а Ускоренной СОЭ
- б Гипергаммаглобулинемии
- в Анемии
- г Тромбоцитопении
- д Лейкоцитоза

К клиническим формам истинной пузырчатки относят все, кроме:

- а Себорейной
- б Листовидной
- в Вегетирующей
- г Импетигинозной
- д Вульгарной

Какой клинический признак характерен для истинной пузырчатки?

- а Полиморфизм высыпаний
- б Сезонность рецидивов
- в Симметричность высыпаний
- г Чувствительность к йоду
- д Симптом Никольского

К клиническим разновидностям бородавок относят все, кроме:

- а Экссудативных
- б Плоских
- в Вульгарных
- г Остроконечных
- д Подошвенных

Для поражения ногтей при псориазе характерно все перечисленное, кроме:

- а Наперстковидных вдавлений
- б Онихолизиса
- в Симптома масляного пятна
- г Платонихии
- д Возможности тотального поражения ногтевых пластин

Энтеропатический акродерматит - обменное заболевание, сопровождаемое недостатком в организме:

- а Меди
- б Железа
- в Витамина С
- г Цинка

Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют следующие особенности, кроме:

- а Папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета
- б Восковидного блеска
- в Сетки Уикхема на поверхности папул
- г Преимущественной локализации на лице

204. Для какого заболевания характерен дискератоз:

- а Контагиозного моллюска
- б Болезни Дарье
- в Хронической семейной доброкачественной пузырчатки
- г Плоскоклеточного рака
- д Розового лишая

При каком заболевании возникают субэпидермальные пузыри?

- а Вульгарной пузырчатке
- б Дисгидрозе
- в Себорейной пузырчатке
- г Дерматите Дюринга
- д Буллёзной эпидермофитии

Меланин синтезируется:

- а Кератиноцитами
- б Клетками Лангерганса
- в Клетками Меркеля
- г Меланоцитами
- д Себоцитами

208. Первичный морфологический элемент при пузырчатке:

- а Пузырек
- б Волдырь
- в Пятно
- г Пузырь
- д Пустула

Онихобласты матрицы обеспечивают:

- а Рост ногтя в ширину
- б Утолщение ногтевой пластинки
- в Плотное соединение ногтя с его ложем
- г Толщину ногтевого валика
- д Рост ногтя в длину

Трихонодозис – это

- а Пучки коротких волос
- б Скрученные волосы
- в Веретеновидные волосы
- г Узловатые утолщения на стержне волоса
- д Спутанные волосы

Для поверхностных стрептодермий характерны все признаки, кроме:

- а Поражения кожи лица и складок
- б Гнойно-некротического воспаления
- в Распространенности в детском возрасте
- г Увеличения размера фликтен по периферии
- д Воспалительного ободка вокруг фликтен

212. Для поверхностной трихофитии волосистой части головы характерно все, кроме:

- а Обламывания волос на высоте 1-2 мм;
- б Обламывания волос на высоте 8-10 мм;
- в Четких границ очагов поражения;
- г Цепочки спор, как правило, внутри волоса;
- д Эритемы, шелушения.

Для регрессирующей стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме:

- а Изоморфной реакции
- б Исчезновения высыпаний
- в Побледнения окраски высыпных элементов
- г Вторичных гипер- или депигментированных пятен
- д Отсутствия периферического роста элементов

Простой контактный дерматит характеризуется всем перечисленным, кроме:

- а Четких границ
- б Локализации в местах контакта с раздражителем
- в Гиперемии
- г Волдырей
- д Острого течения

Какой из указанных ниже методов лечения противопоказан при розацеа:

- а Терапия ретиноидами

- б Витаминотерапия
- в Длительное лечение наружными глюкокортикостероидными препаратами
- г Препараты группы имидазола (трихопол)
- д Антибиотикотерапия (группа тетрациклина)

К клиническим признакам контагиозного моллюска относят все, кроме:

- а Папул
- б Пурпурной окраски
- в Творожистого содержимого
- г Пупковидного вдавления в центре
- д Контагиозной диссеминации

Лечебное питание больных дерматитом Дюринга предусматривает:

- а Ограничение углеводов
- б Ограничение белков
- в Ограничение поваренной соли
- г Исключение из рациона продуктов, приготовленных из злаков

Утолщение шиповатого слоя эпидермиса называют:

- а Спонгиоз
- б Паракератоз
- в Вакуольная дегенерация
- г Акантоз
- д Папилломатоз

Что такое гиперкератоз?

- а Утолщение всех слоев эпидермиса
- б Утолщение базального слоя
- в Утолщение шиповидного слоя
- г Утолщение зернистого слоя
- д Утолщение рогового слоя

Акантолиз - это:

- а Уменьшение числа клеток зернистого слоя
- б Увеличение числа шиповатых клеток
- в Уменьшение числа кератиноцитов
- г Утолщение рогового слоя
- д Ничего из вышеперечисленного

Обнаружение Ig A в дермо-эпидермальной зоне отмечается при:

- а Красном плоском лишае
- б Склеродермии
- в Герпетиформном дерматите Дюринга
- г Парапсориазе

д Трихофитии

Диагноз герпетиформного дерматита Дюринга можно подтвердить, проведя кожную пробу с:

- а Бромидами
- б Новокаином
- в Йодистым калием
- г Антибиотиками
- д Сульфаниламидами

Симптом Асбо-Ганзена наблюдается при:

- а Крапивнице
- б Буллёзной форме красного плоского лишая
- в Герпетиформном дерматите Дюринга
- г Остиофолликулите
- д Акантолитической пузырьчатке

Себорея способствует развитию всех перечисленных ниже заболеваний, кроме:

- а Вульгарных угрей
- б Розацеа
- в Себорейного дерматита
- г Ксантелазмы
- д Себорейной алопеции

Методом выбора при удалении меланоцитарных новообразований является:

- а Криодеструкция
- б Лазерная деструкция
- в Деструкция химическими препаратами
- г Иссечение с гистологическим исследованием

Продолжительность инкубационного периода сифилиса составляет в среднем:

- а 20-40 дней
- б 1-2 месяца
- в 9-12 месяцев
- г 6-9 месяцев
- д 4-6 месяцев

Препарат выбора в лечении гонококковой инфекции:

- а Пенициллин
- б Гентамицин
- в Цефтриаксон
- г Канамицин
- д Эритромицин

325. К препаратам, стабилизирующим мембраны тучных клеток, относится:

- а Димедрол
- б Супрастин
- в Фенкарол
- г Кетотифен
- д Цетиризин

Для чесотки не характерно:

- а Отсутствие субъективных ощущений
- б Светло-коричневые пятна с муковидным шелушением
- в Локализация высыпаний по ходу нервных окончаний
- г Поражение ногтевых пластинок по типу «симптома наперстка»
- д Все вышеперечисленное

Для какого заболевания характерно развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа

- а Склеродермия
- б Системная красная волчанка
- в Тромбоцитопения
- г Контактный дерматит

В основе анафилаксии лежат механизмы

- а Реакции гиперчувствительности I типа
- б Реакции гиперчувствительности II типа
- в Реакции гиперчувствительности III типа
- г Реакции гиперчувствительности IV типа

Синдром Стивенса-Джонсона обычно

- а Начинается подостро
- б Имеет хроническое течение
- в Начинается остро
- г Постоянно рецидивирует

Для синдрома Стивенса-Джонсона характерно

- а Поражение менее 10% кожи
- б Изолированное поражение слизистой оболочки полости рта
- в Поражение более 10% кожи слизистых оболочек глаз, полости рта, носа, половых органов
- г Изолированное поражение слизистых оболочек глаз

Среди клинических разновидностей туберкулезной волчанки отсутствует

- а Веррукозная
- б Серпигинозная
- в Мутилирующая
- г Шанкриформная

Бородавчатый туберкулез кожи дифференцируют со всеми перечисленными заболеваниями, за исключением

- а Экземы
- б Вегетирующей пиодермии
- в Блостомикоза
- г Вульгарных бородавок

Среди клинических форм туберкулезной волчанки отсутствует

- а Плоская
- б Опухолевидная
- в Псориазиформная, диссеминированная
- г Лихеноидная

Для колликативного туберкулеза кожи характерна

- а Локализация узлов в дерме
- б Овальная форма узлов размерами от 0,5 до 1 см
- в Шаровидная форма узлов размером от 1 до 3 см
- г Мелкие узлы размером до 1 см

После вскрытия узла при колликативном туберкулезе образуется

- а Эрозия
- б Язва, рубец
- в Свищевой ход
- г Трещина

Язва при колликативном туберкулезе имеет

- а Плотные вывороченные края
- б Мягкие подрытые края, дно язвы покрыто грануляциями
- в Дно красное, блестящее, чистое
- г Дно язвы покрыто налетом, напоминающее «испорченное сало»

При колликативном туберкулезе рубцы

- а Гладкие, атрофичные
- б Гладкие, гипертрофированные
- в С перемычками (трабекулярные), с сосочковыми возрастаниями
- г Звездчатые

Симптомы, характерные для туберкулезной волчанки

- а Симптом Павлова Н.Ф
- б Симптом Асбо-Хансена
- в Симптом яблочного желе, симптом зонда
- г «Воротничок» Биетта

Морфологические элементы, характерные для туберкулезной волчанки

- Узелок
- Бугорок
- Вегетация
- Пятно

При ВИЧ-инфекции поражаются

- а Т-киллеры
- б В-лимфоциты
- в Т-супрессоры
- г Т-хелперы

Для индивидуальной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции могут быть использованы

- а Метронидазол
- б Хлоргексидин
- в Фукарцин
- г Хлорамин

При надавливании на люпому пуговчатым зондом

- а Возникает резкая болезненность
- б Болезненность не ощущается
- в Болезненность зависит от размера очага
- г Болезненность зависит от стадии и длительности проце

Средняя продолжительность инкубационного периода при чесотке составляет

- а 2 недели
- б 3 недели
- в 28 дней
- г 2 дня

Дерматофиты поражают

- а Кожу, ногти, волосы
- б ЦНС
- в Желудочно-кишечный тракт
- г Слизистые оболочки

К кератомикозам относится

- а Трихофития
- б Разноцветный лишай
- в Эпидермофития стоп
- г Руброфития

Клинические формы руброфитии исключают поражение

- а Стоп и кистей
- б Крупных складок и гладкой кожи
- в Волосистой части головы
- г Онихомикоз

При рубромикозе в процесс вовлекается

- а Кожа ладоней, стоп, ногти, гладкая кожа
- б Кожные покровы, ногти, внутренние органы
- в Кожа ладоней, стоп, ногти, роговица глаза
- г Слизистая полости рта и гениталий

При поражении волос грибами рода *Microsporum* характерно свечение

- а Желто-оранжевое
- б Зеленое
- в Голубоватое
- г Кораллово-красное

При отрубевидном лишае свечение очагов в лучах лампы Вуда

- а Голубоватое
- б Кораллово-красное
- в Золотисто-желтое
- г Свечения нет

Формирование рубцов возможно при

- а Руброфитии
- б Поверхностной трихофитии кожи
- в Эпидермофитии стоп
- г Трихофитии инфильтративно-нагноительной

Плотность инфильтрата при актиномикозе

- а Мягкий
- б Доскообразный
- в Эластичный
- г Желеобразный

Дерматоскопическим признаком базалиомы является

- а Пигментная сеть
- б Ярко-красные лакуны

- в Симптом молотого перца
- г Древоподобное ветвление сосудов

При скрининговом обследовании доноров и беременных следует использовать

- а РМП
- б РМП+ИФА
- в ИФА+ РПГА
- г РМП + РИБТ

Дерматоскопическими признаками гемангиомы являются

- а Молочно-красная вуаль
- б Красные лакуны
- в Сосуды-шпильки
- г Точечные сосуды

Излеченность гонококковой инфекции определяется

- а На основании отрицательных результатов метода ИФА (при исследовании крови) через 15 дней после окончания лечения
- б На основании отрицательных результатов культурального метода исследования или метода амплификации РНК (NASBA) через 14 дней после окончания лечения
- в На основании отрицательных результатов метода микроскопии через 1 месяц после окончания лечения
- г На основании отрицательных результатов метода ПЦР сразу после окончания лечения

Наиболее важным лабораторным исследованием для подтверждения диагноза вульгарной пузырчатки является

- а Исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки
- б Исследование содержимого пузыря на эозинофилы
- в Посев содержимого пузыря на флору
- г Исследование крови на электролиты

После длительного приема препарата Йод-Актив у больного по всему кожному покрову возникли полиморфные высыпания. Наиболее вероятный диагноз

- а Опоясывающий лишай
- б Псориаз
- в Герпетиформный дерматит Дюринга
- г Розовые угри

Возникновение какого из перечисленных вирусных дерматозов у взрослого диктует необходимость изоляции от детей

- а Плоские бородавки
- б Остроконечные бородавки
- в Подошвенные бородавки
- г Опоясывающий герпес

Изоляция ребенка от детского коллектива необходима при

- а Простом герпесе
- б Вульгарных бородавках
- в Плоских бородавках
- г Контагиозном моллюске

Для контагиозного моллюска характерны

- а Полигональные узелки с вдавлением в центре
- б Полушаровидные папулы серовато-розового цвета с шероховатой, ворсинчатой поверхностью
- в Блестящие, гладкие розовато-желтые узелки с углублением в центре
- г Лентикулярные папулы красноватого цвета

У электросварщика 45 лет нос увеличен в размерах, имеет малиново-синюшную окраску с заметно расширенными порами.

Периодически на этом фоне возникают гнойнички. Состояние ухудшается летом.

Предположительный диагноз

- а Дискоидная красная волчанка
- б Туберкулезная волчанка
- в Вульгарные угри
- г Ринофима

Цель наружной терапии при atopическом дерматите

- а Отшелушивающее действие
- б Депигментирующее действие
- в Противовоспалительное действие
- г Сосудосуживающее действие

Волдырь возникает в результате

- а Инфильтрации дермы
- б Отека сосочкового слоя дермы
- в Акантоза
- г Паракератоза

Какое утверждение противоречит общепринятым представлениям о зудящих дерматозах

- а Кожный зуд может быть, как диагнозом, так и симптомом
- б Крапивница характеризуется полиморфизмом высыпаний
- в Строфулюс - это детская почесуха
- г Зудящие дерматозы синонимичны нейродерматозам

Основным морфологическим элементом у больных с диагнозом "Кожный зуд" является

- а Экскориация
- б Волдырь
- в Везикула
- г Папула

В первичном периоде сифилиса с помощью иммуноферментного метода в крови могут выявляться

- а Igg
- б Igm
- в Igm и igg
- г Ige

Во вторичном периоде сифилиса с помощью иммуноферментного метода в крови могут выявляться

- а Igg
- б Igm
- в Igm и igg
- г Ige

HSV-2 — вирус простого герпеса, вызывает поражение

- а Полости рта
- б Половых органов
- в Поражает глаза
- г Инфицирует любую часть тела

Какие методы используют для выявления ВИЧ в исследуемом материале

- а Культуральный
- б Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
- в ИФА
- г Прямая агглютинация

Назовите симптом, характерный для туберкулезной волчанки

- а Триада Ауспитца

- б Симптом «зонда»
- в Симптом «дамского каблучка»
- г Зерна Трелля

Очаги туберкулезной волчанки разрешаются с образованием:

- а Атрофических рубчиков
- б Гиперпигментаций
- в Вегетаций
- г Депигментированных пятен

Укажите стадии первичной лейшманиомы

- а Бугорок, язва, рубец
- б Бугорок, язва
- в Язва, рубец
- г Волдырь

Бугорки при поздно-изъязвляющемся лейшманиозе

- а Розово-красные
- б Желтовато-бурые
- в Красные
- г Желтые

Для псевдолейкодермы характерно

- а Геморрагическое пятно
- б Лихенификация
- в Очаги депигментации на месте регрессировавших высыпаний
- г Воспалительное пятно

К типичным морфологическим элементам туберкулезной волчанки относится

- а Пятно
- б Пузырь
- в Бугорок
- г Гнойничок

Симптом Денье-Моргана характерен для

- а Эритродермии
- б Атопического дерматита
- в Псориаза
- г Склеродемии

Дискератоз патогномоничен для

- а Болезни Дарье
- б Хронической семейной доброкачественной пузырьчатки
- в Плоскоклеточного рака

г Розового лишая

Что из перечисленного не относится к особенностям типичных высыпных элементов красного плоского лишая

- а Папулы плоские, полигональные, красновато-сиреневого цвета
- б Вдавления в центре папул
- в Преимущественная локализация на лице
- г Сетка Уикхема на поверхности папул

Для регрессирующей стадии псориаза характерно все перечисленное, кроме

- а Изоморфной реакции
- б Исчезновения высыпаний
- в Вторичных гипер- или депигментированных пятен
- г Отсутствия периферического роста элементов

Патогномоничным для болезни Девержи является симптом

- а Симптом Поспелова
- б Симптом «терки»
- в Симптом «облатки»
- г Симптом Бенъе

Инкубационный период при краснухе составляет

- а От нескольких часов до нескольких дней
- б 7–9 дней
- в 11 – 21 дней
- г Более 21 дня

Инкубационный период при скарлатине составляет

- а 1 – 7 дней
- б 11 – 21 дней
- в 15 – 45 дней
- г Не известно

Инкубационный период при ветряной оспе составляет

- а 11 – 21 дней
- б Не более 7 дней
- в 7–9 дней
- г Более 21 дня

Больной 13 лет с жалобами на обильную сыпь на туловище и конечностях, сопровождающихся зудом. Сыпь представлена единичным крупным пятном, напоминающим "медальон" с шелушением по типу «папиросной бумаги» и многочисленными эритематозными отечными пятнами небольшой величины по линиям Лангера. Предположительный диагноз

- а Разноцветный лишай
- б Розовый лишай
- в Каплевидный псориаз
- г Нуммулярная экзема

Наиболее частой локализацией папул в полости рта при вторичном рецидивном сифилисе является

- а Спинка языка
- б Миндалины
- в Углы рта
- г Боковые поверхности языка

Отличительным признаком вульгарной пузырчатки от листовидной является

- а Поражение слизистой оболочки рта
- б Конъюнктивит
- в Выпадение волос
- г Изменение ногтей

Характерным элементом острого герпетического (афтозного) стоматита являются

- а Плоская серовато-белая папула
- б «Волосатые» папилломатозные разрастания
- в Небольшие округлые участки поверхностного некроза эпителия с воспалительным ободком
- г Разлитая эритема

Характерным элементом острого герпетического (афтозного) стоматита являются

- а Плоская серовато-белая папула
- б «Волосатые» папилломатозные разрастания
- в Небольшие округлые участки поверхностного некроза эпителия с воспалительным ободком
- г Разлитая эритема

При локализации папулезной формы красного плоского лишая на слизистой полости рта или половых органов необходимо проводить дифференциальный диагноз с

- а Колья
- б Пемфигоидом
- в Узелковыми сифилидами
- г Лимфомой

Для герпетического стоматита характерно

- а На фоне диффузного катарального воспаления эритематозные пятна, иногда с мелкими эрозиями неправильной формы; возможны кожные поражения в виде петехий
- б Неправильной формы глубокие дефекты на слизистой оболочке и нередко на десневом крае, покрытые грязно-серым налетом
- в Единичные, болезненные поверхностные дефекты слизистой оболочки округлой или овальной формы, ограниченные гиперемизированной каймой, иногда с инфильтратом в основании
- г На гиперемизированном фоне кучно расположенные мелкие сферические дефекты слизистой оболочки, иногда в сочетании с пузырьками

К проявлениям первичного сифилиса на слизистой полости рта относят

- а Эрозированные папулы
- б Сифилитические заеды
- в Сифилитическая ангина
- г Шанкр-амигдалит

Пятна Филатова-Коплика - это

- а Серовато-беловатые точки величиной с маковое зерно, окруженные красным венчиком на слизистой щек у боковой группы зубов
- б Узелки серовато-белого цвета с полигональными контурами, которые сливаются между собой
- в Энантема, сопровождающаяся отеком, гиперемией зева и задней стенки глотки и гингивитом
- г Мелкоточечная энантема на слизистой щек, десен

Изменения языка при скарлатине представляют собой

- а Гладкую поверхность с грибовидными сосочками («малиновый язык»)
- б «Лакированный» язык
- в Афты, эрозии, покрытые фибринозным налетом
- г Густой серый налет и десквамация эпителия

Поражение слизистой оболочки полости рта у детей при краснухе представлено

- а Диффузным катаральным стоматитом, «лакированным» языком
- б Пятнами Филатова – коплика
- в Отечностью, гиперемией, афтами, эрозиями, геморрагиями
- г Везикулярными высыпаниями на фоне повышения температуры

Поражение слизистой оболочки полости рта у детей при инфекционном мононуклеозе представлено

- а Диффузным катаральным стоматитом, «лакированным» языком
- б Пятнами Филатова – Коплика
- в Отечностью, гиперемией, афтами, эрозиями, геморрагиями, гипертрофией миндалин с налетами
- г Везикулярными высыпаниями на фоне повышения температуры

Поражение слизистой оболочки полости рта у детей при ветряной оспе представлено

- а Диффузным катаральным стоматитом, «лакированным» языком
- б Пятнами Филатова – Коплика
- в Отечностью, гиперемией, афтами, эрозиями, геморрагиями, гипертрофией миндалин с налетами
- г Везикулярными высыпаниями на фоне повышения температуры

Появление болезненной язвочки на малой половой губе характерно для

- а Генитального герпеса
- б Первичного сифилиса
- в Псориаза
- г Крауроза вульвы

Заболевание кожи, манифестирующее и обостряющееся после стресса

- а Чесотка
- б Аллергический контактный дерматит
- в Атопический дерматит
- г Онихомикоз

Экскориированные акне

- а Быстро регрессируют при наружной терапии

- Характеризуются преобладанием эскориаций на фоне минимально выраженных высыпаний, характерных для акне
- б
  - в
  - г

Важнейшими жалобами при дерматозойном бреде являются

- а Жалобы только на зуд
- б Жалобы только на высыпания
- в Жалобы на заражение кожными паразитами или мелкими живыми существами, не объективизируемыми медицинскими методами
- г Жалобы на боли в крупных суставах конечности

Нейрогенное воспаление составляет основу патогенеза при

- а Атопическом дерматите
- б Истинной акантолитической пузырчатке
- в Болезни Дарье
- г Трофических язвах

Качество жизни при атопическом дерматите

- а Значительно снижается
- б Остается без изменений
- в Не нормализуется в процессе адекватного лечения
- г Обусловлено только фактом отсутствия/наличия высыпаний на лице

До какого возраста возможно сообщение сведений о ребенке, составляющих врачебную тайну, его родителям или законному представителю (без согласия пациента)?

- а До 14 лет
- б До 15 лет
- в До 16 лет
- г До 18 лет

Реинфекция при сифилисе – это

- а Повторное заражение
- б Наслоение новой инфекции на уже имеющуюся при получении дополнительной «порции» бледных трепонем
- в Инфицирование больного ВИЧ
- г Инфицирование пациента с мягким шанкром

Высыпания характерные для вторичного периода сифилиса

- а Бугорковые

- б Папулезные
- в Язвенные
- г Гуммозные

Широкие кондиломы являются клиническими проявлениями

- а Сифилиса нервной системы
- б Сифилиса внутренних органов
- в Вторичного периода сифилиса
- г Третичного периода сифилиса

Назовите разновидности сифилитической алопеции

- а Гнездная
- б Тотальная
- в Сетчатая
- г Мелкоочажковая

Триада Гетчинсона является клиническим проявлением

- а Специфическим признаком раннего врожденного сифилиса
- б Неспецифическим признаком раннего врожденного сифилиса
- в Вероятным признаком позднего врожденного сифилиса
- г Достоверным признаком позднего врожденного сифилиса

Высыпания при вторичном сифилисе

- а Розеолезные
- б Гуммозные
- в Бугорковые
- г Серпентинирующие

Для мягкого шанкра характерно

- а Появление множественных эрозий и выраженная болезненность
- б Плотнoэластический инфильтрат в основании
- в Отсутствие субъективных ощущений
- г Единичные трещины

Перечислите серологические реакции, входящие в КСР (комплекс серологических реакций)

- а РМП, РСК (с кардиолипидным и трепонемным антигенами)
- б РИБТ, ПЦР
- в РИФ
- г ИФА

Различают клинические разновидности типичного твердого шанкра

- а Эрозивный, язвенный
- б Шанкр-амигдалит
- в Шанкр-панариций
- г Индуративный отек

Клинические симптомы, характерные для первичного сифилиса

- а Папулы ладоней и подошв
- б Лабиринтная глухота
- в Саблевидные голени
- г Регионарный лимфаденит

К атипичному твердому шанкру относят

- а Эрозивный
- б Язвенный
- в Шанкр-амигдалит
- г Карликовый

К поздним формам сифилиса относят

- а Сифилис сердечно-сосудистой системы
- б Индуративный отек
- в Гангренизацию
- г Фагеденизм

Основным морфологическим элементом третичного сифилиса являются

- а Бугорок, гумма
- б Папула
- в Язва
- г Везикула

Лечение гонококковой инфекции проводится

- а Пенициллинами
- б Цефалоспоридами
- в Тетрациклинами
- г Нитроимидазолами

Для вульвовагинита трихомонадной этиологии у девочки характерно

- а Отсутствие дизурии
- б Зуд/жжение в области наружных половых органов, патологические влагалищные выделения
- в Отсутствие признаков воспаления наружных половых органов

г Творожистые влагалищные выделения

Для лечения кандидозного  
вульвагинита, назначают

- а Флуконазол внутрь
- б Канамицин
- в Полимиксин
- г Пенициллин

Термином "Ключевые клетки"  
обозначают

- а Клетки влагалищного плоского эпителия влагалища с адгезированными на их поверхности грамположительной кокковой микро флорой
- б Клетки цилиндрического эпителия с внутрицитоплазматическими включениями
- в Клетки влагалищного плоского эпителия с адгезированными на их поверхности грам-вариабельными коккобациллярными микроорганизмами
- г L-форма Gardnerella vaginalis

Наличие гиперемии, отека слизистой  
оболочки половых органов при  
бактериальном вагинозе  
свидетельствует

- а О наличии ИППП или/и других инфекций (кандидоз и др)
- б Является характерным симптомом бактериального вагиноза
- в О длительности заболевания

Кем открыт возбудитель  
гоннококковой инфекции

- а Нейссером
- б Шаудином и Гоффманом
- в Петерсенем
- г Донне

Какими красителями окрашивается  
гонококк при микроскопическом  
исследовании

- а Фуксином
- б Метиленовым синим
- в Толуидиновым синим
- г Нейтральным красным

Возбудители гонореи

- а Пневмококки
- б Менингококки
- в Хламидии
- г Диплококки Нейссера

Дифференциальная диагностика широких кондилом проводится с

- а Остроконечными кондиломами
- б Токсикодермией
- в Отрубевидным лишаем
- г Актиническим кератозом

В целях профилактики бленореи новорожденным закапывают в глаза

- а 30% раствор сульфацила натрия после рождения
- б 30% раствор сульфацила натрия спустя 2 ч после рождения
- в 2% раствор резорцина сразу после рождения
- г 2% раствор резорцина немедленно и спустя 3 ч после рождения

Урогенитальные инфекции, обусловленные анаэробными микроорганизмами, не передаются при

- а Половом контакте с инфицированным партнером
- б Инвазивных методов обследования внутренних половых органов
- в При наличии внутриматочной спирали
- г При посещении бань, саун и других мест общественного пользования

При обнаружении любого венерического заболевания у ребенка в первую очередь подлежат обследованию

- а Родители
- б Соседи
- в Персонал группы детского дошкольного учреждения (воспитательница, няня)
- г Проведения обследования родителей не требуется

Критериями излеченности гонореи женщин являются результаты

- а Клинического обследования, бактериоскопического и бактериологического методов исследования
- б Вагино- и уретроскопии
- в Расширенной кольпоскопии
- г Результаты клинического обследования

В соответствии с МКБ 10 к ИППП не относятся

- а Урогенитальный трихомониаз
- б Гонококковая инфекция
- в Урогенитальная хламидийная инфекция

г Бактериальный вагиноз

Скрининг на сифилис в особых целевых группах (беременные, в том числе направляемые на искусственное прерывание беременности; доноры крови, спермы и тканей; пациенты специализированных стационаров - офтальмологических, неврологических, психоневрологических, кардиологических; ВИЧ-инфицированные) проводится с помощью

- а Одного нетрепонемного теста в количественном варианте
- б Двух трепонемных тестов
- в Комплекса нетрепонемного и трепонемного тестов
- г Трех трепонемных тестов

Урогенитальные трихомонады у женщин наиболее часто локализируются в

- а Влагалище, уретре, шейке матки
- б Уретре, мочевом пузыре, влагалище
- в Влагалище, шейке матки, матке
- г Уретре, влагалище, ампуле прямой кишки

Данные объективного осмотра, характерные для обострения хронического кандидоза гениталий

- а Увеличение и болезненность матки
- б Инфильтрация в области придатков
- в Отек и гиперемия слизистых вульвы и влагалища
- г Отек малых половых губ

При остром гонококковом уретрите у мужчин подлежат исследованию

- а Выделения из уретры и (при отсутствии свободных выделений) соскобный материал стенок уретры
- б Секрет простаты
- в Секрет Куперовых желез
- г Секрет парауретральных желез

При болезни Рейтера хламидийной этиологии обычно регистрируются поражения

- а Урогенитального тракта, глаз, суставов
- б Центральной нервной системы, легких, суставов
- в Почек, сердца, глаз, суставов

г Урогенитального тракта, центральной нервной системы, суставов

Бактериоскопическая идентификация гонококков основывается на следующих признаках, кроме

- а Парности кокков
- б Грам-отрицательности
- в Грам-положительности
- г Бобовидности формы

Индивидуальная профилактика венерических болезней наиболее эффективна, если она проведена после полового акта не позднее

- а 12 часов
- б 24 часов
- в 6 часов
- г 2 часов

При третичном висцеральном сифилисе чаще диагностируется

- а Энтерит
- б Мезаортит
- в Нефросклероз
- г Гепатит

Женщины с острым течением вульвовагинального кандидоза, предъявляют жалобы на

- а Болезненность при половых контактах, дизурические проявления
- б Зуд во влагалище, выделения из половых путей
- в Нарушение менструального цикла, боли внизу живота
- г Дизурические проявления, боли внизу живота

Наследственная предрасположенность имеет значение в развитии

- а Атопического дерматита
- б Простого контактного дерматита
- в Пиодермии
- г Микроспории

К стафилодермиям новорожденных относится

- а Везикулопустулёз
- б Себорейный дерматит
- в Пеленочный дерматит
- г Угри новорожденных

Течение эпидемической пузырчатки новорожденных

- а Латентное
- б Острое
- в С частыми рецидивами
- г Хроническое

При контагиозном моллюске на коже появляются

- а Гнойнички
- б Эрозии
- в Папулы
- г Везикулы

Оптимальным методом лечения контагиозного моллюска у детей является

- а Удаление механическим способом (кюретаж элементов)
- б Электрокоагуляция
- в Радиоволновый метод
- г Удаление лазером

Что из перечисленного применяется при лечении легких форм ихтиоза

- а Ретинола пальмитат, эмолиентная терапия
- б Топические противогрибковые средства
- в Ингибиторы кальциневрина
- г Топические антибиотики и/или антисептики

Частыми осложнениями у новорожденных с врожденным ихтиозом являются

- а Септические осложнения
- б Анафилактический шок
- в Крапивница
- г Отёк Квинке

Для гистологической картины вульгарного ихтиоза характерно

- а Спонгиоз
- б Вакуольная дистрофия
- в Гиперкератоз
- г Акантолиз

Множественные пятна размерами более 5 мм цвета кофе с молоком наблюдаются

- а Нейрофиброматозе I типа
- б Атопическом дерматите
- в Крапивнице
- г Многоформной экссудативной эритеме

Для нейрофиброматоза характерно

- а Уртикарные высыпания
- б Папулезные элементы
- в Нейрофибромы, пятна цвета кофе с молоком
- г Наличие пузырей

При каких микозах отсутствует поражение волос

- а Микроспория
- б Трихофития
- в Фавус
- г Кандидоз

С помощью какого исследования быстро, в on-line режиме можно подтвердить диагноз микроспории волосистой части головы

- а Осмотр под лампой Вуда
- б Микроскопия чешуек кожи
- в Микроскопия волос
- г Культуральное исследование

При микроспории волосистой части головы для лечения препаратом выбора является

- а Гризеофульвин
- б Нистатин
- в Леварин
- г Флюконазол

Для наружного лечения микозов у детей грудного возраста используют противогрибковые средства, содержащие

- а Тербинафин
- б Циклопирокс и циклопироксоламин
- в Бензалкония хлорид
- г Кетоконазол

Наиболее вероятно постнатальное инфицирование новорожденного кандидозом в случае

- а Родоразрешения путем кесарева сечения
- б Обнаружения мекония в околоплодных водах
- в Отслойки плаценты
- г Кандидоза органов мочеполовой системы матери

Герпетиформная экзема Капоши связана

- а С аллергическими реакциями немедленного типа

- б Непереносимостью глютена и продуктов, содержащих йод
- в С вакцинацией против вирусного гепатита
- г Вирусом простого герпеса I

Пигментная крапивница у детей представляет собой

- а Одну из форм мастоцитоза
- б Наследственную крапивницу, связанную с дефицитом ингибитора фактора комплемента C3
- в Холинергическую крапивницу
- г Уртикарию с пигментацией

При контактном аллергическом дерматите высыпания локализуются редко в области

- а Кистей
- б Стоп
- в Лица, век
- г Шеи

При длительном существовании парапсориазных бляшек на их поверхности можно наблюдать феномены

- а «Облатки»
- б «Коллодийной пленки»
- в «Папиросной бумаги»
- г Скрытого шелушения

Что характерно для клиники вульгарного ихтиоза

- а Корки
- б Крупнопластинчатое шелушение
- в Пустулы
- г Везикулы

В основе патогенеза истинной пузырчатки лежат

Клеточные нарушения  
Аутоиммунный процесс  
Неврологические нарушения  
Вирусоносительство

Для клинической картины ладонно-подошвенных кератодермий характерно

- а Выраженный гиперкератоз
- б Яркая эритема
- в Мокнутие
- г Пустулы

Субкорнеальный акантолиз  
характерен для

- а Обыкновенной пузырчатки
- б Вегетирующей пузырчатки
- в Листовидной пузырчатки
- г Себорейной пузырчатки

Синдром Андогского Н.И. - это

- а Сочетание распространенной формы атопического дерматита и мягкой катаракты
- б Изменения кожи, свойственные «атопическому faciесу»
- в Сочетание атопического дерматита и вульгарного аутосомно-доминантного ихтиоза
- г Сезонное поражение подошв у больных атопическим дерматитом

Для клинической картины первого  
возрастного периода атопического  
дерматита свойственны

- а Зимняя стопа
- б Лихенификация
- в Преобладание экссудативных процессов
- г Хейлит

Для терапии ладонно- подошвенного  
гиперкератоза салициловую кислоту  
наиболее удобно применять в  
фиксированных комбинациях с

- а Кальципотриолом
- б Ретиноидами
- в Топическими глюкокортикостероидами
- г Препаратами дегтя

В наружной терапии псориаза  
волосистой части головы с  
выраженными десквамативными  
явлениями рекомендуется  
фиксированная комбинация

- а 5% салициловой кислоты с мометазона фуоратом в форме мази
- б 2% салициловой кислоты с бетаметазоном в форме мази
- в 2% салициловой кислоты с бетаметазоном в форме лосьона
- г 2% салициловой кислоты с флуметазоном пивалатом в форме мази

Действие местных ингибиторов  
кальциневрина при псориазе  
аналогично действию

- а Ацитретина
- б Циклоспорина А
- в Аналогам витамина D
- г Метотрексата

Приобретенный буллезный эпидермолиз - это

- а Аутоиммунное заболевание
- б Поздно дебютирующий врожденный генодерматоз
- в Профессиональный дерматоз
- г Инфекционно-аллергический процесс

Для получения феномена Кёбнера с диагностической целью рекомендуется использовать

- а УФО в гиперэритемной дозе
- б Наносить скарификации
- в Втирание раздражающих мазей
- г Нанесение 10% КОН

Келоидный рубец отличается от гипертрофического наличием

- а Большого количества активных фибробластов
- б Большого количества коллагена
- в Атипичных гигантских фибробластов
- г Превалированием коллагена над эластином

Глюкокортикостероиды целесообразно назначать при лечении

- а Дермографической крапивницы
- б Крапивницы на фоне инфекции
- в Крапивницы на фоне применения ингибиторов АПФ
- г Ангионевротического отека Квинке

Наиболее важным лабораторным исследованием для подтверждения диагноза вульгарной пузырчатки является

- а Исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки
- б Общеклинический анализ крови
- в Исследование содержимого пузыря на эозинофилы
- г Исследование крови на электролиты

Характерными морфологическими элементами для герпетического дерматоза Дюринга являются

- а Только везикулы
- б Везикулы, папулы, волдыри
- в Только эритематозные пятна
- г Пустулы

Для развернутой картины острой экземы характерны высыпания

- а С истинным полиморфизмом элементов
- б С ложным полиморфизмом элементов
- в С обоими видами полиморфизма
- г Мономорфные папулезные

При лихеноидном парапсориазе основным морфологическим элементом сыпи является

- а Лентикулярные папулы 4-6 мм;
- б Милиарные папулы 1-2 мм
- в Бляшки
- г Папулы и везикулы

Трихонодозис – это

- а Узловатые образования на стержне волоса
- б Пучки коротких волос
- в Скрученные волосы
- г Веретеновидные волосы

Для начальной - отечной стадии склеродермии характерно наличие

- а Положительного симптома Никольского
- б Наличие отечного розово-лилового пятна
- в Бордюр из отслоившегося эпидермиса по периферии очагов
- г Положительный симптом Бенъе

Лечение антималярийными препаратами проводится при

- а Синдроме Рейтера
- б Герпетиформном дерматите Дюринга
- в Дискоидной красной волчанке
- г Порокератозе Мибелли

К атипичным разновидностям центробежной кольцевидной эритемы Дарье относят

- а Веррукозную форму
- б Язвенно -некротическую форму
- в Везикулярную форму
- г Гранулематозную форму

В терапии контактного дерматита с высоким риском присоединения вторичной инфекции рекомендовано назначить

- а Фиксированные комбинации топического стероида и антибиотика

- б Фиксированные комбинации топического стероида и антимикотика
- в Фиксированные комбинации топического стероида и салициловой кислоты
- г Фиксированные комбинации топического стероида и мочевины

Для вульгарного ихтиоза патогномонично наличие

- а Корок
- б Крупнопластинчатого шелушения
- в Пустул
- г Везикул

Синонимом туберозного склероза является

- а Болезнь Боровского
- б Синдром Лассюэра-Грекхэма-Литтла
- в Болезнь Прингла-Бурневилля
- г Болезнь Пирогова-Лангханса

Основным патогенетическим механизмом развития буллезного пемфигоида является

- а Кумуляция  $\text{igg}$  в межклеточном пространстве шиповатого слоя эпидермиса
- б Кумуляция  $\text{igg}$  на базальной мембране эпидермиса
- в Скопление  $\text{igg}$  и  $\text{iga}$  в сосочках дермы
- г Лизис шиповатых клеток эпидермиса

Меланоцитарные опухоли обусловлены

- а Увеличением количества меланина
- б Увеличением количества меланоцитов
- в Пролиферацией базалоидных клеток
- г Пролиферацией клеток зернистого слоя

Меланомоопасными невусами являются

- а Диспластический невус
- б Дермальный невус
- в Врожденный невус малого размера
- г Невус Ядассона

К эпителиальным опухолям относятся

- а Трихоэпителиома
- б Прозрачноклеточная акантома
- в Дерматофиброма
- г Меланоцитарный невус

Наиболее значимыми из этиологических факторов при герпетиформном дерматите Дюринга являются

- а Непереносимость антибиотиков
- б Вирусная инфекция
- в Заболевания печени
- г Глютен, йодиды

Препаратом первой линии для лечения герпетиформного дерматита Дюринга является

- а Биологические препараты
- б Ретиноиды
- в Противовирусные средства
- г Препараты сульфонового ряда

Для генерализованной формы опоясывающего герпеса характерно:

- а Диссеминированные множественные папуловезикулы, занимающие значительные участки кожного покрова
- б Унилатеральное расположение элементов
- в Везикулы с кровянистым содержимым и образованием на их месте участков гангренизации
- г Поражаются структуры глаза

Для псевдолейкодермы характерно

- а Геморрагическое пятно
- б Лихенификация
- в Очаги депигментации на месте регрессировавших высыпаний
- г Воспалительное пятно

Изменения кожи, характерные для ограниченной формы склеродермии

- а Эритема, лихенизация, пигментация
- б Эритема, гиперкератоз, рубцовая атрофия
- в Сиреневое отечное пятно, плотная бляшка, атрофия
- г Пятна-«медальоны», чешуйки, пигментация

Положительная йодная проба Ядассона может наблюдаться при

- а Пузырчатке
- б Отрубевидном лишае
- в Розовом лишае Жибера
- г Герпетиформном дерматите Дюринга

У женщины 19 лет отмечается жирная себорея, акне и разрежение волос в теменной области, можно предположить

- а Гиперадрогенный синдром, андрогенетическую алопецию
- б Диффузную алопецию
- в Отсутствие патологии
- г Розацеа, демодекс

Для себорейного дерматита характерно

- а Симптом Картамышева (резкая очерченность бляшек при пальпации)
- б Поверхностное десквамативно-воспалительное поражение, легко отделяющиеся жирные или пропитанные экссудатом чешуйки
- в Феномены Ауспитца-Полотебнова
- г Многослойные сухие жесткие чешуйки серебристо-белого цвета

Эритематозная пузырьчатка это

- а Клинически и гистологически вариант листовидной пузырьчатки
- б Эндемичное заболевание
- в Ассоциируется с опухолями
- г Локализуется в интертригинозных пространствах

Серебристо-белый цвет псориатических высыпаний обусловлен

- а Отсутствием меланина в пораженной коже
- б Особенности наружной терапии псориаза
- в Ускоренной пролиферацией и сниженной адгезией кератиноцитов, наличием пузырьков воздуха в рыхлом роговом слое
- г Аутоиммунным генезом заболевания

Лимфомы кожи

- а Характеризуются доброкачественным течением
- б Происходят из клона лимфоцитов
- в Являются исходом лихеноидного парапсориаза
- г Происходят из эпителиоцитов

Обострение кожного процесса в летнее время и на фоне применения УФО-В терапии наблюдается при

- а Сухой ихтиозиформной эритродермии
- б Дискоидной красной волчанке
- в Энтеропатическом акродерматите
- г X-рецессивном ихтиозе

При длительном течении эритродермической формы болезни Девержи развивается

- а Птоз верхнего века

- б Атрофия зрительного нерва
- в Блефарит
- г Эктропион

Для геморрагического васкулита наиболее характерны

- а Островоспалительный экссудативный процесс
- б Пустулезные высыпания
- в Петехиальные мономорфные элементы
- г Все элементы с геморрагическим компонентом

Келоидный рубец отличается от гипертрофического наличием

- а Большого количества коллагена
- б Атипичных гигантских фибробластов
- в Атипичным коллагеном
- г Превалированием коллагена над эластином

Наиболее важным лабораторным исследованием для подтверждения диагноза вегетирующей пузырьчатки является

- а Исследование мазков-отпечатков на акантолитические клетки
- б Общеклинический анализ крови
- в Исследование содержимого пузыря на эозинофилы
- г Исследование крови на электролиты

Наиболее типичная локализация сыпи при красном плоском лишае

- а Лицо
- б Волосистая часть головы
- в Сгибательная поверхность предплечий
- г Разгибательная поверхность предплечий

После разрешения первичных элементов сыпи при лихеноидном парапсориазе остается

- а Депигментация
- б Рубчик
- в Милиум-подобные келоиды
- г Гиперпигментация (буроватое пятно)

Патоморфологические феномены, степень выраженности которых отражает остроту процесса при парапсориазе

- а Межклеточный отек и вакуольная дегенерация в эпидермисе
- б Акантоз
- в Паракератоз
- г Периваскулярные инфильтраты

Болезнь Девержи наследуется

- а Аутосомно-доминантному типу
- б Аутосомно-рецессивному
- в Х-сцепленному
- г Не установлен

Для гистологической картины лейкоплакии слизистой рта характерно

- а Вакуольная дистрофия эпителия
- б Гранулез эпителия
- в Баллонная дистрофия эпителиальных клеток шиповатого слоя
- г Гиперкератоз эпителия

К факультативным предраковым заболеваниям кожи относятся

- а Лимфомы кожи
- б Синдром Лассюера-Литтля
- в Кератоакантома
- г Псевдопелада Брока

Основными элементами сыпи при болезни Девержи являются

- а Папулы желто-розового или темно-красного цвета величиной с булавочную головку, располагающиеся в устьях волосяных фолликулов
- б Полигональные папулы синюшно-фиолетового цвета
- в Папулы ярко-розового цвета, покрытые серебристо-белыми чешуйками
- г Ярко-розовые пятна с полициклическими очертаниями

Излюбленной локализацией элементов при центробежной кольцевидной эритеме Дарье является

- а Слизистая оболочка полости рта и половых органов
- б Лицо и волосистая часть головы
- в Туловище и проксимальные отделы конечностей
- г Складки кожи

При каплевидном параспориазе определяется

- а Феномен Дарье
- б Феномен «облатки»
- в Феномен Пospelова
- г Феномен Уикхема

Ладонно-подошвенные кератодермии это

- Гетерогенная группа заболеваний с диффузным или
- а ограниченным гиперкератозом в сочетании с эктодермальными дисплазиями
  - б Дискератоз
  - в Аутосомно-доминантный тип наследования
  - г Преждевременная кератинизация и проникновение ороговевших клеток в дерму

Для наружного лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести при стероидофобии рекомендуют

- а Препараты кальципотриола
- б Топические ретиноиды
- в Ингибиторы кальциневрина
- г Топические антигистаминные препараты

Кожный рог это

- а Эпителиальное новообразование
- б Меланоцитарное новообразование
- в Порок развития
- г Врожденное заболевание

В дерме отсутствуют волокна

- а Аргирофильные
- б Эластические
- в Гиалиновые
- г Нервные

Основными клеточными компонентами дермы являются

- а Меланоциты
- б Фибробласты и фиброциты
- в Клетки Лангерганса
- г Клетки Меркеля

Филаггрин синтезируется в слое

- а Базальном
- б Шиповатом
- в Зернистом
- г Блестящем

Отличительной особенностью клеток зернистого слоя является содержание в их цитоплазме

- а Фаголизосом
- б Гранул Бирбека
- в Гранул Орланда
- г Тонофиламентов

Меланин образуется из

- а Тироксина

- б Тирозина
- в Тималина
- г Каротина

Какова функция клеток Лангерганса и клеток Гринштейна в эпидермисе

- а Синтез меланина
- б Антигенпрезентирующая
- в Регуляция кератогенеза
- г Фагоцитоз вирусов

Иммуноглобулины синтезируются в

- а Т- лимфоцитах
- б Полиморфноядерных лейкоцитах
- в Макрофагах
- г Плазматических клетках

Ацилцерамиды в коже отвечают за

- а Окраску кожи
- б Толщину эпидермиса
- в ТЭПВ и связь роговых клеток между собой
- г Обеспечение межклеточного взаимодействия эпидермоцитов

Пролиферативный гиперкератоз - это

- а Утолщение зернистого и рогового слоя в результате ускоренного деления базальных клеток
- б Усиление десквамации роговых клеток
- в Уменьшение десквамации роговых клеток
- г Увеличение количества ламеллярных гранул в роговом слое

Акантоз – это

- а Гипертрофия базального слоя эпидермиса
- б Гипертрофия рогового слоя эпидермиса
- в Утолщение шиповатого слоя
- г Атрофия Мальпигиева слоя

При каких дерматозах показана узкополосная ультрафиолетовая 311-нм фототерапия

- а Фотодерматозы
- б Парасориаз
- в Ограниченная склеродермия
- г Гранулема кольцевидная

К обязательным противошоковым мероприятиям относится применение

- а Атропина
- б Сердечных гликозидов

- в Адреналина
- г Антигистаминных препаратов

В дермальном слое ретиноиды способствуют

- а Синтезу коллагена и волокон, несущих опорную функцию
- б Митотической активности эпителиоцитов
- в Стимуляции иммунного ответа
- г Подавлению ангиогенеза

Неспецифическое гипосенсибилизирующее действие оказывают

- а Кортикостероиды
- б Антибиотики
- в Антимикотики
- г Анаболические стероиды

О начале синдрома «отмены» при лечении глюкокортикоидными гормонами свидетельствует

- а Анорексия
- б Гипотония
- в Анорексия, недомогание
- г Анорексия, недомогание, гипотония

Механизм действия азолов на дрожжевые грибы

- а Связываются с эргостерином клеточной мембраны дрожжевых грибов, нарушая при этом проницаемость клетки
- б Ингибируют эндоплазматический цитохром Р450
- в Специфически подавляют ранний этап биосинтеза стерина в клетке гриба
- г Ингибируют клеточное деление грибковых клеток, нарушая структуру митотического веретена

Недостатками системной антимикотической терапии являются

- а Медленное проникновение препаратов в кожу, слизистые через кровь
- б Риск возникновения побочных явлений
- в Медленное проникновение препаратов через матрикс
- г Медленное проникновение в роговой слой через базальные клетки с последующей их миграцией

Дарсонвализация показана при

- а Выпадении волос
- б Куперозе

- в Гипертрихозе
- г Псевдопелладе

Фотосенсибилизирующими свойствами обладают

- а Антибиотики макролиды
- б Сульфаниламидные препараты
- в Цефалоспорины
- г Фосфолипиды

Изменение клеточной пролиферации возникает при стимуляции

- а Гистаминовых рецепторов I типа
- б Гистаминовых рецепторов III типа
- в Внутриклеточных рецепторов
- г Гистаминовых рецепторов II типа

При наличии аллергии к пенициллину больному противопоказан

- а Ампиокс
- б Гентамицин
- в Тетрациклин
- г Миноциклин

Обследование при витилиго должно включать

- а Биохимический анализ крови
- б Анализ на ревматоидный фактор
- в Осмотр под лампой Вуда
- г Гистологическое исследование

При лечении целиакии и дерматита Дюринга у ребенка из рациона исключают

- а Продукты, содержащие коровье молоко
- б Продукты из ржи, пшеницы, ячменя, риса
- в Продукты из свинины, баранины
- г Салат, щавель, бобовые

Проведение ПУВА-терапии рекомендуется при лечении

- а Пузырчатки
- б Красной волчанки
- в Псориаза
- г Дерматомиозита

Какой из перечисленных симптомов считается признаком активности локализованной склеродермии

- а Шелушение
- б Атрофия

- в Телеангиэктазии
- г Эритематозный венчик

В лечении красной волчанки применяют

- а Препараты никотиновой кислоты
- б Нестероидные противовоспалительные препараты
- в Противомаларийные препараты
- г Ингибиторы кальциневрина

При расположении линейных очагов локализованной склеродермии на голове необходимо проведение

- а Анализа крови с исследованием содержания иммуноглобулинов
- б Лазерной доплеровской флоуметрии
- в Магнитно-резонансной томографии
- г Консультации эндокринолога

Наибольшей глубиной проникновения в кожу обладает

- а Коротковолновое ультрафиолетовое излучение
- б Средневолновое ультрафиолетовое излучение
- в Длинноволновое ультрафиолетовое излучение
- г Инфракрасное излучение

Классификация фототипов по Т.Б. Фицпатрику включает

- а 3 типа кожи
- б 4 типа кожи
- в 5 типов кожи
- г 6 типов кожи

Предиктором плохого ответа на лечение у больных витилиго является наличие

- а Сухости кожи
- б Лейкотрихии
- в Шелушения кожи
- г Дебют в подростковом возрасте

Основным методом неинвазивной диагностики витилиго является

- а Дерматоскопия
- б УЗИ кожи
- в Осмотр очагов поражения в лучах лампы Вуда
- г Конфокальная микроскопия

У больных витилиго повышена частота развития

- а Заболеваний печени
- б Аутоиммунного тиреоидита

- в Язвенной болезни желудка
- г Перикардита

С каким заболеванием дифференцируют ограниченные очаги витилиго на половых органах

- а С анемическим невусом
- б С депигментированным невусом
- в Со склероатрофическим лишаем
- г Лейкоплакией

Папулы Готтрона являются характерным признаком

- а Системной склеродермии
- б Красной волчанки
- в Дерматомиозита
- г Узелкового периартериита

Ре-ПУВА-терапия обычно рекомендуется больным

- а Атопическим дерматитом
- б Себорейным дерматитом
- в Псориазом
- г Красным плоским лишаем

Выделяют многоформную экссудативную эритему

- а Инфекционно -аллергическую
- б Экссудативную
- в Типичную
- г Эрозивно -язвенную

Частым осложнение чесотки является

- а Вторичная пиодермия
- б Сепсис
- в Флегмона
- г Себорея

Для чесотки характерны

- а Геморрагические пятна
- б Точечные зудящие узелково-пузырьковые высыпания
- в Волдыри
- г Полигональные папулы

В терапии чесотки используют

- а Эмульсию бензилбензоата
- б УФО
- в ПУВА-терапию
- г Комбинированные кортикостероидные мази

Для норвежской чесотки характерно

- а Представляет географическую разновидность обычной чесотки
- б Вызывается клещами-паразитами животных
- в Высыпания представлены волдырями, полигональными папулами
- г Возникает на фоне ослабленного иммунитета

Для чесотки «чистоплотных» характерно

- а Развивается у лиц, тщательно соблюдающих гигиенические правила
- б Развивается только у детей
- в Развивается при ослаблении иммунитета
- г При данной форме чесотки зуд отсутствует

Для лечения чесотки рекомендуется использовать

- а Аэрозоль «Оксикорт»
- б Аэрозоль «А-ПАР»
- в Аэрозоль «Спрегаль»
- г Крем «Тридерм»

Самка клеща, извлеченная из чесоточного хода

- а Сохраняет жизнеспособность 5-15 дней
- б Сохраняет жизнеспособность 3-5 часов
- в Сохраняет жизнеспособность до 3 месяцев
- г Сохраняет жизнеспособность до 6 месяцев

Типичной локализацией чесотки у взрослых является

- а Межпальцевые складки кистей
- б Лицо и шея
- в Спина
- г Ладони и подошвы

У ребенка на коже живота множественные цвета кожи плотные на ощупь блестящие узелки с пупковидным вдавливанием в центре.  
Диагноз

- а Контагиозный моллюск
- б Красный плоский лишай
- в Плоские бородавки
- г Чесотка

Общей чертой для контагиозного моллюска и простого герпеса является

- а Это вирусные заболевания кожи
- б Вызываются одними и тем же возбудителем
- в Плохо поддаются лечению

г Могут озлокачиваться

Контагиозный моллюск  
дифференцируют с

- а Ладонно - подошвенным псориазом
- б Красным плоским лишаем
- в Плоскими бородавками
- г Блестящим лишаем

Эпидемические вспышки в детском  
коллективе возможны при

- а Контагиозном моллюске
- б Опоясывающем лишае
- в Белом лишае
- г Псориазе

У мужчины на коже гениталий и  
бедер множественные цвета кожи  
плотные на ощупь блестящие узелки  
с пупковидным вдавливанием в  
центре. Диагноз

- а Контагиозный моллюск
- б Бородавки
- в Остроконечные кондиломы
- г Чесотка

В повседневной практике для  
обнаружения бледных трепонем  
применяется

- а Исследование нативных препаратов в темном поле
- б Окраска по Романовскому-Гимзе
- в Окраска метиленовым синим
- г Серебрение по Морозову

К нетрепонемным тестам относится

- а Иммуноферментный анализ (ИФА)
- б Реакция микропреципитации на стекле (РМП)
- в Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
- г Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)

При третичном сифилисе может быть  
отрицательной реакция

- а Микропреципитации на стекле (РМП)
- б Иммуноферментный анализ (ИФА)
- в Пассивной гемагглютинации (РПГА)
- г Иммунопреципитации бледных трепонем (РИБТ)

РИБТ считается положительной

- а До 20%
- б От 21 до 50%
- в От 51 до 100%
- г 1-5%

Лечение больных препаратами пенициллина связано с риском развития

- а Некроза на месте инъекции
- б Нефропатии
- в Полиневрита
- г Анафилактического шока

После заражения реакция микропреципитации становится положительной

- а Через 3 месяца
- б Через 6-7 недель
- в Через 6 месяцев
- г На 2 неделе

Препаратами выбора для лечения сифилиса являются

- а Макролиды
- б Препараты йода
- в Аминогликозиды
- г Препараты пенициллина

Пробное лечение назначается

- а При слабоположительных результатах серореакций
- б После случайной половой связи
- в При подозрении на сифилис, когда в отделяемом не удается найти бледную трепонему
- г При подозрении на наличие поражений, характерных для третичного сифилиса, когда не предоставляется возможным подтвердить диагноз лабораторными исследованиями

ВИЧ-инфицированному пациенту противопоказаны

- а Сульфаниламиды
- б Иммунодепрессанты, стимулирующие образование Т-клеток
- в Противомаларийные препараты
- г Витамины

Исключения ВИЧ-инфекции необходимо в случае

- а Эрозивно-язвенной формы КПЛ
- б CREST-синдрома
- в Многоформной экссудативной эритемы
- г Контагиозного моллюска у взрослых в области лица и в\ч головы

Маркером ВИЧ-инфекции является

- а Рецидивирующий герпес-зостер

- б Эритематоз
- в Вульгарная пузырчатка
- г Многоформная экссудативная эритема

Наиболее эффективен для лечения хламидийного уретрита

- а Метронидазол
- б Хлоргексидин
- в Бисептол
- г Азитромицин

Для гонококковой инфекции характерно поражение слизистых оболочек, выстланных

- а Переходным эпителием
- б Цилиндрическим эпителием
- в Многослойным плоским неороговевающим эпителием
- г Кубическим эпителием

Мишенью для ВИЧ являются

- а Эозинофилы
- б Т-хелперы
- в Тучные клетки
- г Нейтрофилы

Для лечения урогенитального хламидиоза применяется

- а Трихопол
- б Доксициклин
- в Амоксициллин
- г Гентамицин

Для дисгидротической экземы характерно

- а Везикулы с плотными покрышками на ладонях и подошвах
- б Разрешение процесса с образованием рубцов
- в Бляшки красного цвета с воспалительным валиком по периферии
- г Поражение волосистой части головы

Для клиники микробной экземы характерно

- а Локализация вокруг трофических язв
- б Симметричность
- в Нечеткие границы
- г Папулы ярко-красного цвета

Серьезные колодцы патогномичны для клиники

- а Фиксированной токсикодермии

- б Экземы
- в Синдрома Лайелла
- г Крапивницы

Клинический признак, характерный для перехода экземы в хроническую стадию

- а Пузыри
- б Пустулизация
- в Экскориированные папулы
- г Лихенизация

Дифференциальная диагностика экземы проводится с

- а Сифилисом
- б Склеродермией
- в Аллергическим контактным дерматитом
- г Пузырчаткой

Для острой экземы характерна стадия

- а Атрофическая
- б Индуративная
- в Везикулезная
- г Стационарная

Формирование пузырька при экземе обусловлено

- а Спонгиозом
- б Акантозом
- в Акантолизом
- г Паракератозом

Клиническая разновидность экземы

- а Истинная
- б Отечная
- в Интертригинозная
- г Экссудативно -гиперемическая

Больному с острой мокнущей экземой лица показаны

- а Пасты
- б Лосьоны
- в Мази
- г Примочки

При экземе в эпидермисе гистологически выявляют

- а Паракератоз, акантоз, спонгиоз, вакуольную дегенерацию
- б Гиперкератоз, акантоз, кариолизис
- в Гиперкератоз, микроабсцессы, паракератоз

г Паракератоз, акантоз, акантолиз, кариолизис

Пузырек является первичным элементом при

- а Экземе
- б Пузырчатке
- в Псориазе
- г Крапивнице

Нумулярная экзема – это разновидность

- а Профессиональной экземы
- б Микробной экземы
- в Себорейной экземы
- г Токсикодермии

Эволюционный полиморфизм сыпи характерен для

- а Экземы
- б Псориаза
- в Красного плоского лишая
- г Многоформной экссудативной эритемы

Действие Д-пенициллина при склеродермии

- а Иммуносупрессивное
- б Вазоспастическое
- в Антифиброзирующее
- г Противовирусное

Сиреневый венчик по периферии очага склеродермии свидетельствует о

- а Активности процесса
- б Нерациональной наружной терапии
- в Адекватности терапии
- г Является постоянным признаком

В течении склеродермии выделяют стадии

- а Прогрессирующую , стационарную, регрессирующую
- б Отека, индукции, атрофии
- в Эритемы , гиперкератоза, атрофии
- г Латентную, активную

«Пальцы мадонны» являются признаком

- а Системной красной волчанки
- б Дискоидной красной волчанки
- в Акросклеротической формы склеродермии
- г Линейной склеродермии

Симптом Тибьержа-Вейссенбаха  
характерен для

- а Системной склеродермии
- б Дискоидной красной волчанки
- в Дерматомиозита
- г Пузырчатки

Кисетообразный рот – характерный  
признак для

- а Системной склеродермии
- б Дискоидной красной волчанки
- в Дерматомиозита
- г Пузырчатки

Склеротрофический лишай Цумбуша  
– это разновидность

- а Дискоидной красной волчанки
- б Системной склеродермии
- в Ограниченной склеродермии
- г Опоясывающего лишая

CREST-синдром включает в себя

- а Синдром Рейно
- б Эозинофилию
- в Симптом Никольского
- г Триаду Хазерика

Синдром Сенира-Ашера- это

- а Листовидная пузырьчатка
- б Себорейная пузырьчатка
- в Вегетирующая пузырьчатка
- г Бразильская пузырьчатка

Локализация высыпаний при  
синдроме Сенира-Ашера

- а Себорейные области
- б Аногенитальная область
- в Конъюнктива глаз
- г Боковые поверхности туловища

Пузыри при вульгарной пузырьчатке  
располагаются

- а Внутриэпидермально
- б Интрадермально
- в Субдермально
- г В подкожной жировой клетчатке

Образование пузырей при вульгарной  
пузырчатке обусловлено

- а Акантолизом
- б Акантозом
- в Папилломатозом

г Баллонной дистрофией

Форма пузырчатки, при которой редко поражается слизистая полость рта

- а Вульгарная
- б Листовидная
- в Бразильская
- г Вегетирующая

Для вульгарной пузырчатки патогномонично

- а Высокое содержание эозинофилов в содержимом пузырей
- б Наличие акантолитических клеток в мазках отпечатках
- в Появление пузырей на гиперемизированном отечном фоне
- г Симптом Бенье-Мещерского

Синдром Сенира –Ашера дифференцируют с

- а Себорейным дерматитом
- б Красным плоским лишаем
- в Склеродермией
- г Чесоткой

Образование слоистых корок характерно для пузырчатки

- а Вульгарной
- б Листовидной
- в Вегетирующей
- г Себорейной

Для вульгарной пузырчатки характерно

- а Высокое содержание эозинофилов в содержимом пузырей
- б Наличие дряблых пузырей
- в Появление пузырей на гиперемизированном отечном фоне
- г Симптом Бенье-Мещерского

Характерным симптомом при вульгарной пузырчатке является

- а Ядассона
- б Асбо-Хансена
- в Триада Ауспитца
- г Картамышева

Излюбленная локализация вегетирующей пузырчатки

- а Кожа крупных складок

- б Кожа волосистой части головы
- в Ладони
- г Разгибательные поверхности конечностей

При проведении ПИФ у больных пузырчаткой наблюдается отложение

- а IgG в межклеточном пространстве шиповатого слоя
- б Ig A в межклеточном пространстве шиповатого слоя
- в IgG в области базальной мембраны
- г Ig A на верхушках сосочков дермы

Папилломатозные разрастания на поверхности эрозий характерны для

- а Вульгарной пузырчатки
- б Буллезного пемфигоида
- в Рубцующего пемфигоида
- г Вегетирующей пузырчатки

Диагноз псориаза подтверждает

- а Триада симптомов
- б Наличие чешуек
- в Наличие папул
- г Сезонность обострений

Для стационарной стадии псориаза характерно

- а Свежие высыпания отсутствуют, имеющиеся папулы полностью покрыты чешуйками
- б Высыпания увеличиваются в размерах, чешуйками покрыта центральная часть папул
- в Признаки разрешения в центральной части элементов, очаги причудливых очертаний
- г Появление новых элементов, чешуйки по периферии отсутствуют

Сочетание патоморфологических феноменов, характерных для псориаза

- а Паракератоз, гранулез, спонгиоз, папилломатоз
- б Паракератоз, агранулез, акантоз, папилломатоз
- в Паракератоз, акантолиз, спонгиоз, папилломатоз
- г Спонгиоз, гиперкератоз, акантоз, гранулез.

Узелок является первичным элементом при

- а Псориазе
- б Пузырчатке
- в Импетиго
- г Фурункулезе

Папулы при псориазе

- а Полигональные, покрыты чешуйками, сливаются в бляшки
- б Округлые, растут по периферии, покрыты легко отторгающимися чешуйками
- в Полигональные, имеют пупкообразное вдавление в центре, синюшно-красные
- г Полушаровидные, склонны к группировке, с серовато-белым сетчатым рисунком на поверхности

Патоморфологический феномен, лежащий в основе симптома «стеаринового пятна»

- а Гиперкератоз
- б Акантолиз
- в Акантоз
- г Паракератоз

В патогенезе псориаза ведущую роль играет

- а Патология уrogenитального тракта
- б Генетическая предрасположенность
- в Нарушение водно-солевого обмена
- г Иммунодефицит

Излюбленная локализация высыпаний при обыкновенном псориазе

- а Крупные складки
- б Сгибательные поверхности конечностей
- в Разгибательные поверхности конечностей
- г Туловище

Для поражения ногтей при псориазе характерно

- а Наперстковидные вдавления
- б Онихомикоз
- в Подногтевые бородавки
- г Ногтевые пластины в виде часовых стекол

Феномен «точечного кровотечения» при псориазе обусловлен (исходя из патоморфологии псориаза)

- а Акантозом
- б Агранулезом
- в Папилломатозом
- г Паракератозом

У больного псориазом 3 недели назад по всему кожному покрову стали появляться свежие милиарные папулы, особенно по ходу расчесов. Симптомом, описанным в данном случае, является

- а Псориатическая триада
- б Симптом Уикхема
- в Симптом Бенъе – Мещерского
- г Симптом Кебнера

Для прогрессирующей стадии псориаза характерно

- а Появление новых узелков, положительный симптом Кебнера, рост элементов
- б Свежие высыпания отсутствуют, имеющиеся папулы полностью покрыты чешуйками
- в Признаки разрешения в центральной части элементов, очаги причудливых очертаний
- г Новые высыпания не появляются, нет признаков периферического роста папул

Высыпания при простом пузырьковом лишае следует дифференцировать с твердым шанкром так как

- а Возбудителем твердого шанкра является вирус
- б Он может локализоваться на коже половых органов.
- в Он может передаваться половым путем  
Он может локализоваться на половых органах и
- г передаваться половым путем, а высыпания представлены эрозиями

Больная 27 лет предъявляет жалобы на высыпания в области слизистой оболочки рта, болезненность. Объективно: на фоне отечной и гиперемированной слизистой щек и десен имеются небольшие группы пузырьков, которые вскрываются и на их месте образуются эрозии с неправильными мелкофестончатыми очертаниями, покрытые нежной фибринозной пленкой. Диагноз

- а Вульгарная пузырчатка
- б Многоформная экссудативная эритема
- в Герпетический стоматит
- г Лекарственная токсидермия

Образование пузырьков при простом герпесе происходит в результате

- а Спонгиоза
- б Акантоза
- в Баллонной дистрофии
- г Акантолиза

Характерным признаком для простого герпеса является

- а Склонность к рецидивированию после нервного или физического перенапряжения
- б Хроническое течение без периодов ремиссии
- в Начало заболевания на фоне приема антигистаминных препаратов
- г Возникновение заболевания только один раз в жизни

Опасное заболевание, вызванное простым герпесом

- а Сикоз
- б Пемфигоид
- в Кандидоз
- г Экзема Капоши

Нейродерматотропизмом обладает

- а Вирус папилломы человека
- б Вирус контагиозного моллюска
- в Вирус варицелла-зостер
- г Вирус простого герпеса и варицелла- зостер

В очаге поражения при простом герпесе обнаруживаются

- а Гнойнички и язвы
- б Узелки и чешуйки
- в Папулы и волдыри
- г Пузырьки, эрозии и корочки

Пузырьковые высыпания на губах может вызывать вирус

- а Простого герпеса 1-го или 2-го типа
- б Простого герпеса только 2-го типа
- в Варицелла - зостер
- г Папилломы человека

При наружном лечении пиодермий применяют

- а Кондилин
- б Мазь фузидовой кислоты
- в Серную мазь
- г 5% декспантенол крем

К смешанным пиодермиям относится

- а Гидраденит
- б Щелевидное импетиго

- в Вульгарное импетиго
- г Вульгарный сикоз

Больному с фурункулом в стадии узла на коже предплечья назначают

- а Чистый ихтиол
- б Кортикостероидные мази
- в Примочки с антисептиками
- г Вскрытие фурункула

Глубокая форма стрептодермии

- а Стрептококковая заеда
- б Эктима
- в Околоногтевая фликтена
- г Вульгарное импетиго

Опасность фурункула носогубного треугольника заключается в развитии

- а Флегмоны шеи
- б Заглоточного абсцесса
- в Тромбоза кавернозного синуса
- г Флегмоны дна полости рта

Для оптимизации лечения больного фурункулезом прежде всего назначают

- а УВЧ
- б Рентгенографию легких
- в Исследование крови на сахар
- г Витаминотерапию

Развитие фурункулеза может быть обусловлено

- а Гепатитом
- б Пиелонефритом
- в Гипертонической болезнью
- г Сахарным диабетом

Стафилококковый анатоксин показан при

- а Гидрадените
- б Рецидивирующем фурункулезе
- в Щелевидном импетиго
- г Импетиго ногтевых валиков

При вскрывшемся фурункуле назначают

- а Антибиотики внутрь
- б Повязка с чистым ихтиолом
- в Повязка с гипертоническим раствором
- г Мази с кортикостероидами

Поверхностное стафилококковое поражение кожи

- а Остиофолликулит
- б Фурункул
- в Гидраденит
- г Вульгарное импетиго

Основное различие между фурункулом и фурункулезом заключается в

- а Этиологическом факторе
- б Количестве высыпаний
- в В первичном элементе
- г Общей симптоматике

Сикоз вульгарный локализуется на

- а Коже лица
- б Коже конечностей
- в Коже в крупных складках
- г Коже локтей и коленей

Поверхностное стрептококковое поражение кожи

- а Остиофолликулит
- б Фурункул
- в Околоногтевая фликтена
- г Сикоз

Для местного лечения стрептококкового импетиго применяют

- а Фузидовой кислоты 2% мазь
- б Преднизолоновую мазь
- в Мометазона фураат 0,1%
- г Цинка пиритион

При фурункулезе в носогубном треугольнике в первую очередь необходимо

- а Хирургическое вскрытие
- б Госпитализировать пациента
- в Назначить витаминотерапию
- г Назначить неспецифическую иммунотерапию

Первичный морфологический элемент, характерный для вульгарного импетиго

- а Пустула
- б Узел
- в Бугорок
- г Волдырь

К глубокой форме стафилококкового поражения кожи относят

- а Остиофолликулит
- б Фолликулит
- в Фурункул
- г Сикоз

Для лечения фурункула в области носогубного треугольника необходимо назначить

- а Метилпреднизолон ацепонат мазь
- б Пенициллин или другие антибиотики
- в Фенкарол
- г Стугерон

Для дифференциальной диагностики шанкриформной пиодермии назначают

- а Исследование под лампой Вуда
- б Гистологическое исследование
- в Исследование на бледную трепонему
- г Скарификационную пробу

Терапевтические рекомендации, целесообразные для больных фурункулезом

- а Антибиотики широкого спектра действия
- б Психотерапия
- в Рентгенотерапия
- г Рефлексотерапия

Первичный морфологический элемент, характерный для гидраденита

- а Пятно
- б Папула
- в Узел
- г Бугорок

Фликтена является первичным морфологическим элементом сыпи при

- а Вульгарном сикозе
- б Фурункулезе
- в Стрептококковом импетиго
- г Остеофолликулите

При фурункуле в стадии инфильтрации следует назначать

- а Вскрытие фурункула
- б Чистый ихтиол

- в Цинковую пасту
- г Комбинированные кортикостероидные мази

Стафилококковое поражение кожи-это

- а Стрептококковое импетиго
- б Гидраденит
- в Околоногтевая фликтена
- г Эктима

Для местного лечения стрептококкового импетиго применяют

- а Мазь, содержащую 2% мупироцин
- б Метилпреднизолон ацепонат мазь
- в Натамицин
- г Гликолан

Лечение больного фурункулезом может быть существенно оптимизировано

- а Исследованием печени
- б Исследованием иммунного статуса
- в Определением наличия белка в моче
- г Цитологическим исследованием

Больному с фурункулом верхней губы прежде всего назначают

- а Повязку с мазью Вишневского
- б Повязку с мазью с антибиотиком
- в Немедленное вскрытие фурункула
- г Антибиотики внутрь

Поверхностная форма стафилодермии

- а Вульгарный сикоз
- б Гидраденит
- в Карбункул
- г Вульгарное импетиго

При фурункулезе назначают

- а Натамицин
- б Сиофор
- в Адвантан эмульсию
- г Стафилококковый анатоксин, антибиотики

Для герпетиформного дерматита Дюринга характерно

- а Отсутствие субъективных ощущений
- б Высыпания на фоне неизменной кожи
- в Положительный симптом Никольского
- г Сгруппированность высыпаний

Эозинофилия пузырной жидкости  
наблюдается при

- а Атопическом дерматите
- б Герпетиформном дерматите Дюринга
- в Простом контактном дерматите
- г Пузырчатке

Симблефарон - характерный признак

- а Вульгарной пузырчатки
- б Рубцующего пемфигоида
- в Листовидной пузырчатки
- г Герпетиформного дерматита Дюринга

При проведении ПИФ у больных  
пемфигоидом наблюдается  
отложение

- а IgG в межклеточном пространстве шиповатого слоя
- б Ig A в межклеточном пространстве шиповатого слоя
- в IgG в области базальной мембраны
- г Ig A на вершущках сосочков дермы

Проба Ядассона проводится для  
подтверждения

- а Пузырчатке
- б Многоформной экссудативной эритемы
- в Герпетиформного дерматита Дюринга
- г Пемфигоида

Повышенная чувствительность к  
йоду свойственна

- а Пузырчатке
- б Многоформной экссудативной эритеме
- в Герпетиформному дерматиту Дюринга
- г Пемфигоиду

Наиболее эффективны при лечении  
герпетиформного дерматита Дюринга

- а Антибиотики пенициллинового ряда
- б Препараты сульфонового ряда
- в Препараты йода
- г Антигистаминные препараты 2 поколения

Пузыри при буллезном пемфигоиде

- а Тонкостенные, с дряблой крышкой
- б Не склонны к самопроизвольной эпителизации
- в Разрешаются с образованием рубцов
- г Напряженные, расположены субэпидермально

Разновидность пемфигоида

- а Листовидный

- б Вульгарный
- в Рубцующий
- г Пустулезный

Рецидивирующий опоясывающий лишай может быть маркером

- а Экземы
- б ВИЧ-инфекции
- в Панкреатита
- г Сифилиса

Герпетическая инфекция является противопоказанием для применения

- а Антигистаминных
- б Глюкокортикостероидов
- в Ферментных средств
- г Антимикотиков

Принципиальным отличием опоясывающего лишая от простого герпеса является

- а Как правило, возникает один раз в жизни
- б Первичным элементом является везикула
- в Высыпания сопровождаются жжением
- г Пузырьки склонны к группировке

Локализация пузырьковых высыпаний по ходу тройничного, лицевого или межреберных нервов наиболее характерна для

- а Опоясывающего лишая
- б Простого пузырькового лишая
- в Папилломы и простого пузырькового лишая
- г Пузырчатки

Первичный элемент, характерный для опоясывающего лишая это

- а Пустула
- б Чешуйка
- в Пузырек
- г Эрозия

Взрослого изолируют от детей при возникновении у него

- а Плоского лишая
- б Опоясывающего герпеса
- в Псориаза
- г Многоформной экссудативной эритемы

Нестероидные  
противовоспалительные средства  
целесообразно включать в  
комплексную терапию

- а Вульгарных бородавок
- б Плоских бородавок
- в Чесотки
- г Опоясывающего лишая

Наиболее часто неврологические  
осложнения возникают после  
перенесенного

- а Герпетической экземы Капоши
- б Опоясывающего лишая
- в Буллезного пемфигоида
- г Кандидоза

Длинные волосы поражаются при

- а Красном плоском лишае
- б Отрубевидном лишае
- в Опоясывающем лишае
- г Микроспории

Светло-коричневые пятна с  
отрубевидным шелушением на коже  
верхней половины туловища  
характерны для

- а Витилиго
- б Склеродермии
- в Отрубевидного лишая
- г Чешуйчатого лишая

К дерматомикозам относится

- а Эпидермофития
- б Эритразма
- в Красный плоский лишай
- г Отрубевидный лишай

*Trichophyton rubrum* является  
возбудителем

- а Эпидермофитии
- б Рубромикоза
- в Микроспории
- г Кандидоза

Паховую эпидермофитию  
дифференцируют с

- а Сикозом
- б Фурункулезом
- в Эритразмой
- г Чесоткой

Microsporum ferrugineum является возбудителем

- а Антропофильной микроспории
- б Инфильтративно-нагноительной микроспории
- в Глубокой микроспории
- г Интертригинозной микроспории

Клиническая форма микозов стоп

- а Поверхностная
- б Глубокая
- в Интертригинозная
- г Пустулезная

Фитиды (микиды) - это

- а Осложнение микоза вторичной инфекцией
- б Зоофильные грибы
- в Вторичные аллергические высыпания
- г Разновидность кератомикозов

Пузырьковые высыпания в области свода стоп, напоминающие зерна саго характерны для

- а Везикулезной формы микоза стоп
- б Латентной формы микоза стоп
- в Дисгидротической формы микоза стоп
- г Экссудативной формы микоза стоп

Проба с йодом (проба Бальцера) применяется для диагностики

- а Красного плоского лишая
- б Эпидермофитии стоп
- в Отрубевидного лишая
- г Сифилитической лейкодермы

Кандидоз в полости рта проявляется в виде

- а Налета белого цвета, легко снимающегося при поскабливании шпателем
- б Высыпаний белого цвета, не снимающихся при поскабливании шпателем
- в Глубоких язвенно-некротических поражений
- г Рубцовой атрофии

Malassezia furfur может являться возбудителем

- а Отрубевидного лишая
- б Эритразмы
- в Рубромикоза
- г Микроспории

Волосы обламываются на высоте 6-8 мм от уровня кожи при

- а Микроспории
- б Фавусе
- в Трихофитии
- г Алопеции

Источником заражения руброфитией является

- а Человек
- б Кошка
- в Корова
- г Мышь

В стадии мокнутия при дисгидротической эпидермофитии для наружной терапии лучше всего использовать

- а Присыпки
- б Мази
- в Кремы
- г Примочки

Интертригинозная форма эпидермофитии локализуется

- а В подмышечных областях
- б В паховых складках
- в В межпальцевых складках стоп
- г В межъягодичных складках

Первичный элемент, характерный для отрубевидного лишая

- а Волдырь
- б Папула
- в Пятно
- г Пустула

Препарат, применяемый при лечении микроспории волосистой части головы

- а Гризеофульвин
- б Нистатин
- в Хлоргексидина биглюконат
- г Мупироцин

Источником заражения зоонозной микроспорией чаще являются

- а Крупный рогатый скот
- б Кошки
- в Грызуны
- г Птицы

Симптом «стружки» характерен для

- а Эритразмы

- б Кандидоза
- в Паховой эпидермофитии
- г Отрубевидного лишая

Метод диагностики, позволяющий идентифицировать разновидность гриба

- а Микроскопический
- б Культуральный
- в Биохимический
- г Люминисцентный (лампа Вуда)

Дисгидротическую форму эпидермофитии необходимо дифференцировать с

- а Дисгидротической экземой
- б Красным плоским лишаем
- в Нейродермитом
- г Чесоткой

Для лишая склеротического атрофического характерным является

- а Наличие инфильтрации у основания пятнистых и/или бляшечных элементов
- б Отсутствие инфильтрации у основания пятнистых элементов
- в Незначительное возвышение над уровнем кожи пятнистых элементов
- г Эритематозно-папулезная экзантема

Появление болезненной язвочки на малой половой губе характерно для

- а Генитального герпеса
- б Первичного сифилиса
- в Псориаза
- г Крауроза вульвы

Дерматозойный бред представляет собой

- а Восприятие объектов («паразитов») там, где их в действительности нет
- б Разубеждаемое представление о внедрении в пространство кожного покрова живых существ - паразитов
- в Бред преследования
- г Патологическое восприятие слов, речей о животных

Больные дерматозойным бредом наиболее часто обращаются за медицинской помощью к

- а Психиатрам
- б Психотерапевтам

- в Дерматологам
- г Психологам

Невротические эксфолиации это

- а Нанесение расчесов на кожу и слизистые оболочки при различных зудящих дерматозах
- б Артифициальный дерматит, относящийся к обсессивно-компульсивным расстройствам
- в Расстройство, подлежащее дерматологическому лечению
- г Расстройство, не подлежащее коррекции

СПИД развивается при

- а Ослаблении иммунной системы ВИЧ, оппортунистическим инфекциям и злокачественным опухолям
- б Возникновении вторичных заболеваний
- в Потери массы тела
- г Поражении ЦНС

Дифференциальная диагностика лейкодермы проводится с

- а Розовым лишаем
- б Отрубевидным лишаем
- в Токсикодермией
- г Трихофитией

К методам профилактики врожденного сифилиса относится

- а Двукратное серологическое обследование беременных женщин
- б Трехкратное серологическое обследование беременных женщин
- в Ежемесячное серологическое обследование
- г Однократное серологическое обследование беременных женщин

Шанкр-амигдалит представляет собой

- а Язву миндалин
- б Симметричный процесс
- в Увеличение миндалин плотной консистенции
- г Увеличение миндалин без изменения плотности

При третичном сифилисе наиболее часто встречается поражение внутренних органов в виде

- а Нефросклероза
- б Цирроза печени
- в Мезаортита
- г Энтерита

После заживления гумм при третичном сифилисе формируются рубцы

- а Мозаичные
- б Плоские
- в Звездчатые
- г Келоидные

Исходом сгруппированного бугоркового сифилида является

- а Гипопигментация
- б Гладкий рубец
- в Мозаичный рубец
- г Келоидный рубец

В составе нормобиоты половых путей женщин репродуктивного возраста превалируют

- а *Lactobacillus* spp.
- б *Streptococcus* spp.
- в *Staphylococcus* spp.
- г *Bacteroides* spp.

Особенностями бактериального вагиноза при отсутствии ИППП являются

- а Острое местное воспаление, высокий лейкоцитоз в мазках, окрашенных по Граму
- б Острое местное воспаление, лейкоциты в пределах нормы в мазках, окрашенных по Граму
- в Минимальные воспалительные явления при наличии повышенного количества лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
- г Отсутствие воспалительной реакции в мазках, окрашенных по Граму, снижение колоний лактобактерий, преобладание анаэробных микроорганизмов

Термином «ключевая» клетка обозначается

- а Клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутрицитоплазматические включения
- б Клетка влагалищного эпителия, покрытая грамвариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой микрофлорой
- в Клетка влагалищного эпителия, покрытая грамвариабельными коккобациллярными микроорганизмами
- г Клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грамположительной кокковой микрофлорой

К третичным сифидам относят

- а Широкие кондиломы
- б Мелкоочаговое облысение
- в Папулы ладоней и подошв
- г Сгруппированные бугорки

Сифилитическая гумма является

- а Невоспалительным узлом
- б Отеком сосочкового слоя дермы
- в Инфекционной гранулемой
- г Папулезным доброкачественным новообразованием

Сифилитический бугорок является

- а Инфекционной гранулемой
- б Папулезным доброкачественным образованием
- в Отеком сосочкового слоя дермы
- г Специфическим васкулитом

Началом вторичного периода сифилиса является

- а Появление твердого шанкра
- б Появление лимфангита
- в Появление лимфаденита
- г Появление генерализованных высыпаний

Первичный период сифилиса начинается с

- а Появления твердого шанкра
- б Внедрения бледной трепонемы в организм
- в Позитивации RPR
- г Регионарного лимфаденита

Первичный период сифилиса заканчивается с

- а Развитием полиаденита
- б Появлением розеолезной сыпи
- в Появлением гуммы
- г Развитием продромальных явлений (субфебрилитет, головная боль, недомогание и т.д.)

Укажите признак, характерный для неосложненного твердого шанкра

- а Болезненность
- б Гнойное отделяемое
- в Подрытые края
- г Плотнo-эластический инфильтрат в основании

Особенностями бактериального вагиноза при отсутствии ИППП являются

- а Отсутствие воспалительной реакции в мазках, окрашенных по Граму, снижение колоний лактобактерий, преобладание анаэробных микроорганизмов
- б Острое местное воспаление, лейкоциты в пределах нормы в мазках, окрашенных по Граму; Острая местная воспалительная реакция, резко
- в повышенное количество лейкоцитов в мазках, окрашенных по Граму
- г Минимальные воспалительные явления при наличии повышенного количества лактобактерий по данным ПЦР и цитоллиз

Спинная сухотка – это

- а Дистрофически-дегенеративный процесс в задних канатиках спинного мозга
- б Дистрофически-дегенеративное поражение передних рогов спинного мозга
- в Очаги демиелинизации в веществе спинного мозга
- г Диффузная гуммозная инфильтрация спинного мозга

При дифференциальной диагностике гуммозного сифилиса и других объемных процессов имеют значение данные

- а Компьютерной томографии
- б Эхо – ЭЭГ
- в ЭЭГ
- г Серологических реакций

Возбудителем шанкроида является

- а Гонококк
- б Трихомонада влагалищная
- в Кишечная палочка
- г Стрептобацилла Дюкрея-Унны- Петерсона

С какими заболеваниями в первую очередь следует дифференцировать шанкроид

- а Склероатрофический лишай
- б Туберкулез
- в Болезнь Бехчета
- г Сифилис, аногенитальный герпес

Симптом День-Моргана характерен для:

- а Эритродермии
- б Хронической экземы
- в Атопического дерматита
- г Псориаза
- д Склеродемы Бушко

К группе «гемосидерозов» кожи не относится:

- а Болезнь Шамберга
- б Зудящая пурпура Левентала
- в Телеангиэктатической пурпуре Майокки
- г Пурпура Шенлейна-Геноха
- д Лихеноидный ангиодермит Гужеро-Блюма

Наиболее значимыми из этиологических факторов при герпетиформном дерматите Дюринга являются:

- а Непереносимость антибиотиков
- б Вирусная инфекция
- в Заболевания печени
- г Глютен, йодиды

Для псевдочесотки характерно все, кроме:

- а Заражение от животных
- б Зуд кожи
- в Папулы, уртикарии, папуловезикулы
- г Язвы

Для атрофодермии Пазини – Пьерини характерно все, кроме:

- а Пятна округлых очертаний
- б В центральной части пятен развивается поверхностная рубцовая атрофия
- в Застойно-розового цвета с лиловой зоной по периферии
- г Образования язвенных дефектов

Для центробежной эритемы Биетта характерно:

- а Пустулезные высыпания на фоне эритемы
- б Локализация эритемы на коже груди
- в Генерализованные кольцевидные высыпания
- г Возможность трансформации в системную форму заболевания

Для базалиомы характерно:

- а Агрессивное течение
- б Локализация на открытых участках тела
- в Отсутствие метастазирования
- г Спонтанный регресс опухоли

Для базалиомы характерно:

- а Агрессивное течение
- б Локализация на подошвах
- в Метастазирует редко
- г Спонтанный регресс опухоли

Феномен, характерный для чесотки

- а Признак Сезари
- б Симптом Кебнера
- в Симптом Бенъе
- г Симптом Бернгардта

Акарицидные препараты применяются для лечения

- а Чесотки
- б Пузырчатки
- в Микроспории
- г Склеродермии

К дерматофитам относится

- а *C. Albicans*
- б *M. Canis*
- в *Scopulariopsis brevicaulis*
- г *Aspergillus*

Группа заболеваний с негрибковой этиологией

- а Кератомикозы
- б Дерматофитии
- в Псевдомикозы
- г Глубокие микозы

Поражение ногтя при руброфитии

- а Проксимальной зоны
- б Латеральной зоны
- в Дистальной зоны
- г Медиальной зоны

Симптом Воронова - это

- а Псевдоатрофический ободок шириной 2-5 мм вокруг псориатической папулы
- б Ощущение четкой границы при пальпации псориатических бляшек
- в Вид атрофии кожи
- г Стойкая пятнистая телеангиэктазия

Типичные высыпания на коже при красном плоском лишае

- а Везикулы
- б Уртикарии
- в Полигональные плоские, блестящие, фиолетовые папулы
- г Уртикарии, везикулы, папулы (полиморфизм)

Симптом Поспелова - это

- а Симптом «скомканной папиросной бумаги»

- б Ощущение четкой границы при пальпации псориатических бляшек
- в Лучистообразное уплотнение при размягчении кальцином
- г Стойкая пятнистая телеангиэктазия

Пузырь при пемфигоиде образуется за счет

- а Акантолиза шиповатого слоя эпидермиса
- б Скопления аутоиммунных комплексов на вершущках сосочков дермы
- в Плотного инфильтрата из эозинофилов в сосочковом слое дермы
- г Аутоиммунного процесса в зоне между базальноклеточной плазматической мембраной и базальной пластинкой

У больного вульгарной пузырчаткой через 8 дней приема 60 мг преднизолона появились новые высыпания. Необходимо назначить

- а 80 мг преднизолона
- б 65 мг метипреда
- в 56 мг полкортолона
- г 120 мг преднизолона

Факторами риска развития меланомы являются

- а I-II фототип
- б Контакт с мышьяком
- в Наличие менее 10 невусов
- г Использование наружных глюкокортикостероидных препаратов

Проведение онкопоиска требуется при появлении за короткий промежуток времени большого количества

- а Дерматофибром
- б Себорейных кератом
- в Лентиго
- г Акрохордонов

Оптимальным методом удаления диспластических невусов является

- а Электрокоагуляция
- б Криодеструкция
- в Лазерная коагуляция
- г Иссечение скальпелем с гистологическим исследованием

Меланомоопасным является

- а Гигантский врожденный невус
- б Врожденный невус среднего размера
- в Маленький врожденный невус
- г Дермальный невус

Хирургическому удалению подлежат

- а Простые меланоцитарные невусы
- б Себорейные кератомы
- в Травмированные невусы
- г Фиброэпителиальные полипы

Для оценки состояния кожи  
волосистой части головы используют  
метод

- а Трихоскопии
- б Жидкокристаллической термографии
- в Скин-визиометрии
- г Кутометрии

Повышенное содержание  
эозинофилов в пузыре обнаруживают  
при

- а Герпетическом дерматите Дюринга
- б Экземе
- в Опоясывающем лишае
- г Буллезной форме токсидермии

Филаггрин синтезируется в слое

- а Базальном
- б Шиповатом
- в Зернистом
- г Блестящем

Филаггрин синтезируется в

- а Базальном слое эпидермиса
- б Шиповатом слое эпидермиса
- в Зернистом слое эпидермиса
- г В дерме

Филаггрин синтезируется в

- а Дерме
- б Эпидермисе
- в Подкожно-жировой клетчатке

Для оценки состояния кожи  
волосистой части головы используют  
метод

- а Трихоскопии
- б Жидкокристаллической термографии
- в УЗИ
- г Кутометрии

Симптом Воронова - это

- а Псевдоатрофический ободок шириной 2-5 мм вокруг псориатической папулы
- б Ощущение четкой границы при пальпации псориатических бляшек
- в Кожа, имеющая вид папиросной бумаги
- г Стойкая пятнистая телеангиэктазия

Меланомоопасным является

- а Травмированный меланоцитарный невус
- б Врожденный невус среднего размера
- в Маленький врожденный невус
- г Дермальный невус

Меланомоопасным является

- а Невоклеточный голубой невус
- б Врожденный невус среднего размера
- в Маленький врожденный невус
- г Дермальный невус

Меланомоопасным является

- а Диспластический невус
- б Врожденный невус среднего размера
- в Маленький врожденный невус
- г Дермальный невус

Оптимальным методом удаления травмированных невусов является

- а Электрокоагуляция
- б Криодеструкция
- в Лазерная коагуляция
- г Иссечение скальпелем с гистологическим исследованием

Заболеваний с негрибковой этиологией

- а Кератомикозы
- б Дерматофитии
- в Грибовидный микоз
- г Глубокие микозы

При меланоме in situ опухолевый инфильтрат расположен в:

- а Эпидермисе
- б Дерме
- в ПЖК

Меланоцитарные опухоли обусловлены

- а Увеличением количества меланина
- б Увеличением количества меланоцитов

в Проллиферацией базалоидных клеток

Меланоцитарные опухоли обусловлены

- а Увеличением количества меланина
- б Увеличением количества меланоцитов
- в Выраженной плоскоклеточной дифференцировкой

В стандарт оснащения кабинета дерматовенеролога входит

- а Трихоскоп
- б УЗИ
- в Дерматоскоп

Несовершеннолетние имеют право подписывать информированное согласие:

- а Старше 15 лет
- б Старше 12 лет
- в Старше 13 лет

Лечебное питание больных себореей и вульгарными угрями предусматривает все перечисленное, кроме

- а Гипоаллергенной диеты
- б Уменьшения в рационе животных жиров
- в Исключения поваренной соли
- г Исключения острых блюд

Несовершеннолетние имеют право подписывать информированное согласие:

- а Старше 15 лет
- б Старше 17 лет
- в Старше 14 лет

К микозам относится все, кроме:

- а Кератомикозы
- б Дерматофитии
- в Грибовидный микоз
- г Глубокие микозы

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а УЗИ
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Себуметрии

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а Дерматочкопии
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Корнеометрии

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а Дерматочкопии
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Трихоскопии

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а Сиаскопии
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Трихоскопии

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а Сиаскопии
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Капиляроскопии

Заключительный диагноз ставится на основании:

- а Сиаскопии
- б Осмотра в лучах лампы Вуда
- в Патоморфологического исследования
- г Конфокальной микроскопии

Симптом Арди-Горчакова встречается при:

- а Атопическом дерматите
- б Чесотке
- в Парапсориазе
- г Туберкулёзной волчанке

Симптом Арди-Горчакова встречается при:

- а Псориазе
- б Чесотке
- в Парапсориазе
- г Красном плоском лишае